

## Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière



### FICHE DESCRIPTIVE TOMATE DE BANCHETTE

**Nom scientifique:** *Capsicum annum L.*

**Nom commun:** *Poivron.*

**Dénomination:** *Poivron de Roletto, Poivron d'Exilles, Poivron de Montagne.*

**Origine géographique:** *Région Piémont – Province de Turin – Roletto et zone limitrophe, haute Vallée de Suse. Probablement importé des régions du Sud de l'Italie au siècle dernier.*

**Reproduction:** *autogame – 30% de risque de croisement entre variétés de poivron de même espèce.*

#### Caractéristiques de la PLANTE

**Pigmentation anthocyanique de l'ipocotyle:** *absence.*

**Hauteur à plein développement:** *70 cm.*

#### Caractéristiques du FRUIT

**Couleur avant maturation:** *vert.*

**Forme en section longitudinale:** *triangulaire.*

**Couleur à maturation:** *rouge avec de nombreuses craquelures longitudinales.*

**Port du fruit:** *pendulaire.*

**Dimension du fruit:** *diamètre de 4 à 5 cm – longueur de 5 à 7 cm.*

**Épaisseur de la pulpe:** *de 0,3 cm à 0,6 cm.*

**Capsaïcine du placenta:** *absence.*

# POIVRON DE MONTAGNE / CULTURE

## APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES

Il préfère les positions ensoleillées, les sols légers ou demi légers, de pH optimum 5,5-7,0. Il craint l'eau stagnante.

## EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION

Semer en pépinière de Mars à fin Avril, planter en mai avec des distances inter-plantes de 45-50 cm et inter-rangs de 70 cm. Floraison de Juillet à Octobre. Récolte de Septembre à Novembre.

## TRAVAUX A REALISER

Pour éviter de casser les branches portant des fruits, il est nécessaire de les tuteurer en plaçant aux extrémités des rangées des piquets et en tirant un fil de fer galvanisé ou une corde synthétique entre eux. Les branches fruitières reposeront sur les cordages.

## EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

Apports (kg/quintal de produit):

N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO
0,4	0,15	0,5	0,3	0,08

Le poivron profite des apports de matières organiques. Il profite également des apports foliaires et des bio-stimulants.

## ROTATION

Éviter les successions avec d'autres solanacées, les chou fleurs et les courgettes.

## PROTECTION CONTRE LES VIRUS

Pour éviter la transmission des virus CMV et PVY par les pucerons, protéger les plantes avec un voile insecte-proof. Dans le cas où les semences sont autoproduites, il est important d'éviter de ne pas propager le virus de la mosaïque de la tomate (ToMV) en désinfectant les semences avec de la Javel à 10%.

## MALADIES ET RAVAGEURS

Parmi les agents pathogènes, Phytophthora capsici est le principal problème phytosanitaire principal. Les principaux ravageurs inféodés à la culture sont les pucerons vecteurs de virus et la pyrale.



Le Poivron de Montagne est une variété très rustique adaptée à nos zones vallonnées et montagneuses. Il produit en quantité considérable jusqu'aux premières gelées. C'est une variété tardive à fruits exclusivement rouges. Elle s'adapte bien aux types de terrains et est peu exigeante en eau et en nutriment. Elle souffre cependant du vent qui casse ses branches latérales.

Projet Interreg Alcotra n. 139 "Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière"

[www.bioeurope.info](http://www.bioeurope.info)