




# Abricotiers

*Prunus armeniaca* L.


Porte-greffe : Myrobolan

Variétés	Code GEVES	Numéro de page
Bergarouge	3	4
Bergeron	3	5
Luizet Suchet	4	6
Muscat de Provence	E	7
Muscat pêche de Nancy	E	8
Polonais	3	9
Poman rosé	4	10
Rouge de Rivesaltes	4	11
Rouge du Roussillon	3	12
Rouget de Sernhac	E	13
Tardif de Bordaneil	4	14




- **Monilia laxa sur fleurs**


**Pourcentage de rameaux atteints par Monilia laxa**




**Pourcentage de fruits/fleurs totales  
Sensibilité au Monilia laxa en 2011**



- **Coryneum**



- **Forficules**



## Bergarouge<sup>(R)</sup>

Avirine

*Origine : française, INRA d'Avignon.  
Classe au Catalogue : 3.  
Arbre : vigueur forte.  
Port : érigé, compact dans le Roussillon.*



*Floraison : demi-tardive.*

*Compatibilité florale : autofertilité partielle. Fantasma<sup>®</sup>, Avikour, Bergeron, Hélène du Roussillon.*

*Fruit : gros calibre, forme oblong allongée, couleur orange intense avec zone rouge diffus (40 à 50% de la surface). Résistant aux manipulations.*

*Chair : ferme, bonne qualité gustative, sucrée et juteuse.*

*Consommation : frais, conserverie ou pâtisserie.*

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
<b>Bergarouge</b>	20-mars	10-juillet
<b>Référence</b>	Même jour que Bergeron	Même jour que Bergeron

**Données référencées :**

*Maladies : sensible au monilia.*

*Comportement vis-à-vis du gel : aucune information disponible.*

**Observations de terrain :**

***Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** Variété faiblement atteinte par le monilia sur fleurs en 2011 ; en revanche elle s'est montrée particulièrement sensible au monilia sur rameaux en 2012 et 2013. En 2011, elle présente de fortes attaques de forficules sur fruits. En 2012, quelques pousses sont attaquées par les tordeuses et 20 % des fruits présentent des dégâts de forficules.*

## Bergeron

Gabrielle Bergeron

**Origine :** française, issu d'un semis de hasard par M. Bergeron, St-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon en 1920.

**Classe au Catalogue :** 3.

**Arbre :** vigueur moyenne.

**Port :** semi-érigé à semi-étalé.

**Productivité :** bonne en moyenne vallée du Rhône, faible en zone méridionale.



**Floraison :** demi-tardive.

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** gros calibre, forme oblongue arrondie. Cuvette pédonculaire superficielle. Orangé recouvert d'une surimpression rouge sur 10 à 40% du fruit. Assez résistant aux manipulations. Perte d'arôme en chambre froide.

**Noyau :** allongé, amande douce.

**Chair :** orangée, de fermeté très marquée. Qualité gustative moyenne, manque de jus.

**Consommation :** assez bonne aptitude pour l'élaboration de fruits au sirop.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
<b>Bergeron</b>	20-mars	10-juillet
<b>Référence</b>	Variété de référence	Variété de référence

**Données référencées :**

**Maladies :** sensible au monilia sur fleurs.

**Comportement vis-à-vis du gel :** bonne résistance au gel sur fleurs et sur jeunes fruits.

**Observations de terrain :**

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** En 2012, quelques pousses attaquées par les tordeuses. Variété faiblement atteinte par le monilia sur rameaux en 2013, en revanche c'est aussi la plus sensible au coryneum la même année.

**Origine :** française, 1<sup>ère</sup> inscription 1961.

**Classe du catalogue :** 4

**Arbre :** rameaux assez nombreux, productif et rustique.

**Port :** érigé.

## Luizet S

H



**Floraison :** mars.

**Fruit :** gros calibre, forme ovoïde allongée, joues plus ou moins renflées et sillon étroit mais profond, à la base surtout. Epiderme légèrement duveteux, jaune orange ponctué de rouge pourpre et lavé à l'insolation d'un rouge clair brillant.

**Noyau :** libre, très gros, ovoïde allongé. Amande à peu près douce.

**Chair :** jaune intense, ferme, sucrée, acidulée, plus ou moins parfumée.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
<b>Luizet Suchet</b>	20-mars	10-juillet
<b>Référence</b>	Même jour que Bergeron	Même jour que Bergeron

**Données référencées :**

**Maladies :** Aucune information disponible.

**Comportement vis-à-vis du gel :** Aucune information disponible.

**Observations de terrain :**

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** Variété peu sensible aux pucerons verts et aux tordeuses en 2012. En 2013, elle est moyennement sensible au monilia sur rameaux et assez sensible au coryneum.

## Muscat de Provence

**Origine :** française, 1<sup>ère</sup> inscription 1970.

**Classe du Catalogue :** E variété ancienne d'amateur.

**Arbre :** très ramifié, entre-nœud très court. Fructifications sur bouquet de mai et chiffonnes.

**Port :** pleureur.

**Floraison :** début mars.

**Fruit :** poids assez faible, forme ovoïde au profil carré, pédoncule court, glabre et non adhérent. Epiderme orangé couvert de rouge sur plus de la moitié de la surface, pubescent, peu adhérent à la chair.

**Chair :** orange foncé, ferme, juteuse à très juteuse, sucrée, très parfumée, musquée, de bonne qualité.



Données 2011

	Date floraison	Date récolte
<b>Muscat de Provence</b>	20-mars	10-juillet
<b>Référence</b>	Même jour que Bergeron	Même jour que Bergeron



*Données référencées :*

*Maladies : Aucune information disponible.*

*Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.*

*Observations de terrain :*

*Sensibilités relevées de 2011 à 2013 : Aucune information disponible.*

## Muscat pêche de Nancy

Abricot Nancy, Abricot p

**Origine** : française, Lot-et-Garonne, 1961.

**Classe du Catalogue** : E variété ancienne d'amateur.

**Arbre** : vigoureux, très ramifié, entre-nœuds courts. Produit sur bouquets de mai et chiffonnes situés sur rameaux âgés de 2 et 3 ans.

**Port** : retombant.



**Floraison** : très précoce.

**Fruit** : calibre moyen, forme oblong arrondie avec un lobe plus développé que l'autre, à structure profonde et pédoncule de longueur moyenne, légèrement adhérent et sans pilosité. Epiderme légèrement pubescent, orangé, très peu ponctué de rouge, adhérent à la chair.

**Noyau** : libre, petit par rapport au fruit, oblong circulaire, amande douce. Le fruit a tendance à chuter avant la maturité.

**Chair** : orangée de fermeté moyenne, peu juteuse, sucrée, équilibrée, bonne qualité gustative.

**Consommation** : de préférence en frais.

Données 2011

**Muscat pêche de Nancy**

**Date floraison**

20-mars

**Date récolte**

10-juillet

**Référence**

Même jour que Bergeron

Même jour que Bergeron

**Données référencées :**

**Maladies** : Aucune information disponible.

**Comportement vis-à-vis du gel** : Aucune information disponible.

**Observations de terrain :**

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013** : En 2011, cette variété est fortement atteinte par le monilia sur fleurs alors qu'en 2012 peu de rameaux sont infestés. En 2011, les fruits sont faiblement attaqués par les forficules. En 2012, les dégâts de forficules touchent 3 % des fruits. En 2013, elle fait partie des variétés les moins atteintes par le coryneum, mais les dégâts de monilia sur rameaux sont assez importants.

## Polonais

**Origine :** française, issus de semis de hasard, 1<sup>ère</sup> inscription 1961.

**Classe du Catalogue :** 3

**Arbre :** vigueur moyenne, bonne productivité mais dans des zones très délimitées, variété qui n'accepte que des milieux spécifiques

**Port :** semi-érigé à semi-étalé.

Orangé de Provence



**Floraison :** époque moyenne.

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** calibre moyen à gros, forme légèrement oblong. Epiderme orangé clair avec parfois une légère surimpression rouge. Dans certains cas, la base reste verte.

**Noyau :** libre, grand et allongé, amande douce.

**Chair :** orangée, bonne qualité gustative.

**Consommation :** aptitude à l'élaboration de fruits au sirop variable mais généralement assez bonne.

**Remarque :** Variété adaptée à des milieux très précis, mais curieusement très différents entre eux.

Date floraison

Date récolte

Données 2011

Polonais

20-mars

10-juillet

Référence

Même jour que Bergeron

Même jour que Bergeron

**Données référencées :**

**Maladies et accidents:** Chute des bourgeons floraux fréquente dans certaines zones. Assez bonne tolérance au Monilia sur fleurs.

**Comportement vis-à-vis du gel :** assez bonne résistance sur fleurs et bonne résistance sur fruits.

**Observations de terrain :**

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** Pour les trois années d'observation, cette variété est faiblement infestée par le monilia sur fleurs et sur rameaux. En 2011, elle est faiblement attaquée par les forficules sur fruits et en 2012 leurs dégâts atteignent 1,5 % des fruits. Elle présente une sensibilité moyenne au coryneum en 2013.

## Poman Rosé

**Origine :** France (Provence).

**Classe du Catalogue :** 4.

**Arbre :** vigueur moyenne, avec des rameaux courts et puissants, exigeant au niveau culture : terrains frais et fertiles. Production un peu irrégulière.

**Port :** mi-érigé, réussit mieux en forme libre ou de plein vent, haute ou demi-tige.



Données 2011

**Poman Rosé**

**Date floraison**

20-mars

**Date récolte**

10-juillet

**Référence**

Même jour que Bergeron

Même jour que Bergeron

Pomeau rosé, Blanc P  
Blanc Pommeau rosé



**Floraison :** tardive.

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** calibre moyen comprimé sur les joues et allongé, à dos caréné. Epiderme jaune pâle, rosé, pointillé de rouge pourpre sur le côté ensoleillé.

**Noyau :** allongé, assez plat, amande douce ou très peu amère.

**Chair :** jaune pâle à rosée, bien ferme, saveur suave à la fois fine et bien sucrée. Se détache bien du noyau.

**Consommation :** très bon pour la conserverie, fruits confits, et confitures de luxe.

**Remarque :** Le fruit se fend et a facilement tendance à pourrir en cas de forte humidité en fin de maturité

**Données référencées :**

**Maladies :** sensible au monilia lors de printemps froids et humides, ainsi qu'à la tavelure

**Comportement vis-à-vis du gel :** Aucune information disponible.

**Observations de terrain :**

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** En 2011 et 2012, elle est faiblement atteinte par le monilia sur fleurs et sur rameaux, l'attaque est moyenne en 2013. En 2011, elle est faiblement atteinte par les forficules. Quelques pousses sont attaquées par les tordeuses en 2012 et les dégâts de forficules touchent 5 % des fruits. On observe un peu de coryneum en 2013 (il n'a pas été observé pour les années précédentes).

## Rouge de Rivesaltes

**Origine** : française, semis de Rouge du Roussillon, repéré en 1950 par l'INRA.

**Classe du Catalogue** : 4

**Arbre** : très bonne vigueur, bonne productivité.

**Port** : semi-érigé à semi-étalé.



**Floraison** : précocité moyenne.

**Compatibilité florale** : auto-compatibilité.

**Fruit** : gros calibre, rond légèrement dissymétrique, structure profonde. Epiderme orange clair, partiellement recouvert d'une zone rouge.

**Noyau** : taille moyenne, oblong, amande amère.

**Chair** : orangée, bonne fermeté, arôme très prononcé. Très bonne qualité gustative.

**Consommation** : mauvaise aptitude à l'élaboration de fruits au sirop.

**Remarque** : variété très proche de Rouge de Roussillon mais avec un plus gros calibre .

### Date floraison

11-mars

### Date récolte

5-juillet

### Référence

9 jours avant Bergeron

5 jours avant Bergeron

### Données référencées :

**Maladies, accidents** : Possibilité de chute de fruits immatures suite à une baisse brutale de température.

**Comportement vis-à-vis du gel** : bonne résistance au gel sur fleurs.

### Observations de terrain :

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013** : En 2011, elle est faiblement atteinte par le monilia sur fleurs et en 2012-2013 cette variété est moyennement infestée par le monilia sur les rameaux. En 2011, elle est peu attaquée par les forficules. Quelques pousses sont atteintes par les tordeuses et les pucerons verts en 2012 et on note des dégâts de forficules sur 7 % des fruits. On observe aussi un peu de coryneum en 2013.

## Rouge du Roussillon

**Origine :** française, apparue vers 1830 en Pyrénées-Orientales.

**Classe du catalogue :** 3

**Arbre :** bonne vigueur, très productif.

**Port :** semi-érigé à semi-étalé.



Données 2011

### Date floraison



Flor

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** calibre moyen, forme arrondie, légèrement dissymétrique, suture assez profonde. Epiderme orangé clair recouvert de ponctuations rouge sur la surface ensoleillée. Sensible aux manipulations.

**Noyau :** calibre moyen, oblong, amande amère.

**Chair :** orangée, bonne fermeté, sucré, arôme prononcé mais consistance pâteuse.

**Consommation :** mauvaise aptitude à l'élaboration de fruits au sirop. Utilisé pour la confiture.

**Remarque :** variété intéressante pour sa productivité et la saveur de son fruit, ce qui en fait un bon fruit de table, dans la limite de son faible calibre et de sa texture pâteuse

# Rouget de Sernhac

Précoce de Sernhac

**Origine :** française, découvert à Sernhac (Gard) par M. Rouget au début de ce siècle.

**Classe du Catalogue :** E Variété ancienne d'amateur.

**Arbre :** vigoureux et productif. Ramification importante. Nécessite des hivers assez froids.



Floraison : moyenne

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** calibre moyen (39g), épiderme orange, rouge sur le côté ensoleillé.

**Noyau :** semi-adhérent, allongé, amande légèrement amère. Supporte bien le transport et les manipulations.

**Chair :** orangée, ferme, qualité gustative moyenne.

**Consommation :** moyenne à bonne aptitude à l'élaboration de fruits au sirop.

Données 2011

**Rouget de Sernhac**

**Date floraison**

11-mars

**Date récolte**

5-juillet

**Référence**

9 jours avant Bergeron

5 jours avant Bergeron

**Données référencées :**

**Maladies :** sensible au monilia.

**Données référencées vis-à-vis du gel :** résistance moyenne sur fleurs et assez bonne sur fruits. **Maladies, accidents:** tolérante à la sharka. Sensible au monilia sur fleurs et à la tâche noire sur fruits. Possibilité de chute de fruits immatures suite à une baisse brutale de température.

**Observations vis-à-vis du gel :** très bonne résistance au gel sur fleurs et jeunes fruits.

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** En 2011, c'est la deuxième variété la plus

**Observations de terrain :** sensible au monilia sur fleurs. Elle est peu attaquée par les forficules au cours de cette période. **Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** En 2011, cette variété est moyennement attaquée par les forficules. En 2012 et 2013, elle est fortement atteinte sensible au coryne sur fleurs et sur rameaux ; l'attaque est moyenne en 2013. En 2012, les dégâts de forficules atteignent 5 % des fruits. Elle est touchée par le coryneum de manière assez importante en 2013.

**Origine :** française, Pyrénées-Orientales, 1<sup>ère</sup> inscription en 1970.

**Classe du Catalogue :** 4.

**Arbre :** vigoureux à très vigoureux, productivité faible.

**Port :** semi-érigé à semis étalé.

## Tardif de Bordaneil



**Floraison :** semi-précoce.

**Compatibilité florale :** auto-compatibilité.

**Fruit :** gros à très gros calibre, forme légèrement oblong. Epiderme orange clair recouvert d'une zone rouge intense. Bonne résistance aux manipulations.

**Noyau :** gros, oblong, à surface rugueuse, adhérent légèrement à la chair certaines années. Amande amère.

**Chair :** orangée, bonne fermeté, bonne qualité gustative, juteux.

**Consommation :** assez bonne aptitude à l'élaboration de fruits au sirop.

Données 2011

**Tardif de Bordaneil**

*Données référencées :*

**Référence**

**Date floraison**

20-mars

Même jour que Bergeron

**Date récolte**

10-juillet

Même jour que Bergeron

*Maladies : bonne tolérance au monilia sur fleurs.*

*Comportement vis-à-vis du gel : bonne résistance au gel sur fleurs et jeunes fruits.*

### Observations de terrain :

**Sensibilités relevées de 2011 à 2013 :** En 2011, cette variété est faiblement attaquée par les forficules. En 2011, elle est moyennement contaminée par le monilia sur fleurs, mais fortement infestée par le monilia sur rameaux en 2012, un peu moins en 2013. En 2012, les dégâts de forficules touchent 20 % des fruits. C'est la variété la moins sensible au corynetum en 2013.