



Pêcher

Porte-greffe : Julior Ferdor®

Variétés	Chair	Code GEVES	Numéro de page
Amsden	Blanche	E	5
Charles Ingouf	Blanche	E	6
Charles Roux	Blanche	E	7
Dixired	Jaune	E	8
Early Redhaven	Jaune	E	9
Genadix 4	Blanche	Radiation en 2007	10
Guilloux Elegante	Blanche	E	11
Plate Oriane	Jaune	3	12
Red Robin	Blanche	E	13
Redwing	Blanche	4	14
Sweet Cap	Blanche	F	15




- **Cloque :**




Aucune pousse cloquée en 2013 sur le site de Maillane.

- **Pucerons :** Le nombre de pousses attaquées par le puceron vert (*Mysus persicae* et *Brachycaudus amygdalinus*) et le puceron noir (*Brachycaudus persicae*) sont observés depuis 2011.



- **Maladie criblée** (*Coryneum beijerinckii* Oudemans)



• **Monilia laxa sur fleurs**


Origine : Américaine (Missouri), obtenu d'un semis au hasard, 1^{ère} inscription 1961.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : bonne vigueur, boutons floraux doubles. Bonne productivité.

Port : semi-horizontal, bas.

Pourcentage de fleurs moniliées en 2012 (par rapport au nombre total de fleurs)



Amsden

Pêche de Juin

Fl

Fr

Fl dissymétrique, suture légèrement profonde, sillon souvent craquelé vers le sommet. Epiderme duveteux, semi-fin, rouge foncé, moyennement taché, rayé. Supporte mal le transport à maturité.

Noyau : semi-libre, peu adhérent.

Chair : blanche avec un peu de rouge, peau.

Tendre, juteuse, saveur douce.
Grain moyen.



Données référencées :



Sensibilité à la rouille. Peu sensible au coryneum et à la cloque. Résistante au monilia.
Vis-à-vis du gel : résistance moyenne aux gelées d'hiver.

Obs

Observations :
Données de 2010 à 2013 : Fortement attaquée par le puceron cigarier en 2011. En 2010, fortement atteinte par le coryneum. En 2011, faiblement attaquée par la cloque et le coryneum. En 2012, fortement atteinte par les pucerons verts, moyennement infestée par le coryneum et faiblement attaquée par les tordeuses. Variété la plus touchée par le puceron vert.



Date floraison

Début avril
jours après Redwing

Date récolte

Début juillet
jours après Redwing

Pêcher

Origine : française, Troyes (Aube) en 1896.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : très bonne vigueur, boutons floraux doubles. Bonne productivité.

Port : semi-horizontale.

Charles Ingouf



Floraison : début avril, rosacée.

Fruit : calibre moyen de 130g, forme dissymétrique avec une lèvre plus développée, sillon assez souvent craquelé vers le sommet. Epiderme duveteux, semi-épais, rouge foncé, nombreuses rayures assez fines vers la cavité.

Supporte très bien le transport

Noyau : semi-libre, allongé, petit, profondément sculpté, clair.

Chair : blanche, avec quelques traces de rouge, grain assez fin, tendre, juteuse et sucrée.



Données 2011

Charles Ingouf

Référence

Date floraison

Début avril

jours après Redwing

Date récolte

Début juillet

jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : très sensible à la cloque. Peu sensible au coryneum, à la rouille et au monilia.

Comportement vis-à-vis du gel : bonne résistance aux gelées d'hiver.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Moyennement atteinte par le coryneum sur feuilles en 2011. Moyennement touchée par les pucerons verts et la cloque en 2011. Faiblement atteinte par le monilia sur fleurs en 2011 et moyennement attaquée par le monilia sur rameaux en 2012. Fortement atteinte par la cloque et moyennement par les tordeuses et les pucerons verts en 2012. En 2013, l'attaque des pucerons verts est assez importante et elle est particulièrement sensible au coryneum.

Pêcher

Origine : française, 1^{ère} inscription : 1961.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : bonne vigueur, boutons floraux doubles. Très bonne productivité.

Port : semi-horizontal, bas.

Charles Roux



Floraison : début avril, campanulée.

Fruit : calibre moyen de 165g, forme arrondie, dissymétrique avec souvent une lèvre bien plus développée. Suture variable, superficielle à profonde. Epiderme peu pubescent, rouge foncé, moyennement taché, rayé.

Noyau : libre, moyen, globuleux, moyennement sculpté, assez clair.

Chair : blanche avec quelques traces rouges. Grain assez fin, tendre, juteuse, bien sucrée.

Date récolte

Charles Roux

Fin mars

Mi-juillet

Référence

jours après Redwing

jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque. Peu sensible au coryneum, à la rouille et au monilia.

Comportement vis-à-vis du gel : bonne résistance aux gelées d'hiver.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Moyennement attaquée par le coryneum en 2010 et 2011. Moyennement attaquée par puceron cigarier. En 2011, faiblement atteinte par le monilia sur fleurs et moyennement attaquée par la cloque. En 2012, très fortement attaquée par les pucerons verts et moyennement atteinte par la cloque et les tordeuses. En 2013, cette variété est assez sensible au coryneum, mais moins attaquée par le puceron vert.

Origine : U.S.A (Georgie).
Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.
Arbre : bonne vigueur, bonne productivité mais parfois irrégulière.
Port : bas, étalé.

Dixired



Floraison : normale, campanulée.
Compatibilité florale : auto-compatibilité
Fruit : calibre moyen (160 à 170g), forme arrondie, parfois légèrement dissymétrique, moyennement pubescent.
Epiderme rouge vif avec des stries plus foncées.
Noyau : semi-libre, assez petit, globuleux, clair.
Chair : jaune, grain fin, ferme, assez juteuse, bonne qualité gustative, peu parfumée.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Dixired	25-mars	05-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : sensible au gel sur fleurs.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Fortement attaquée par le coryneum en 2010 et 2011. En 2011, moyennement attaquée par le puceron farineux du prunier et par la cloque. Faiblement infestée par le monilia sur fleurs au cours de cette même année. En 2012, moyennement attaquée par la cloque et fortement par les tordeuses. D'une manière générale, c'est la seule variété qui est restée totalement insensible aux pucerons verts de 2011 à 2013.

Early Redhaven

Redhaven

Origine : U.S.A. (Michigan), 1955.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : bonne vigueur, ramification importante et puissante. Productivité très bonne et régulière.

Port : érigé, assez bas.



Floraison : normale, campanulée.

Fruit : calibre moyen à gros (150 à 170g), forme arrondie, régulier, légèrement oblong. Epiderme jaune orangé, coloré de rouge vif. Bonne résistance à la manipulation et au transport.

Noyau : semi-libre, moyen sans fente.

Chair : jaune, fine, fondante, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée. Bonne qualité gustative.

Consommation : utilisation en conserverie.

Floraison

Date récolte

Early Redhaven

01-avril

05-juillet

Référence

jours après Redwing

jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque et très sensible au *fusicoccum amygdali*.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2010, faiblement atteinte par le coryneum. La plus fortement attaquée par le monilia sur fleurs en 2011. Faiblement atteinte par le puceron cigarier au cours de cette même année. En 2011 et en 2012, moyennement atteinte par la cloque et les pucerons verts. En 2012, faiblement attaquée par les tordeuses et fortement infestée par le monilia sur rameaux. Variété peu sensible aux pucerons verts et au coryneum en 2013.

Origine : française.

Classe du Catalogue : Inscrite au catalogue en 1971 et radiée en 2007.

Arbre : bonne vigueur.

Port : semi-étalé, bas.

Genadix 4



Floraison : normale à tardive.

Fruit : gros calibre, forme circulaire. Epiderme duveteux. Noyau libre. **Chair :** blanche, parfumée, sucrée, juteuse. Grain assez fin, légèrement filandreuse.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Genadix 4	25-mars	05-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : peu sensible au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2010, moyennement atteinte par le coryneum mais fortement atteinte en 2011. En 2011, fortement atteinte par la cloque et moyennement attaquée par les pucerons verts. Très peu atteinte par le puceron cigarier en 2011. Faiblement atteinte par le monilia en 2011 et 2012. En 2012, moyennement infestée par la cloque et les pucerons verts et fortement attaquée par les tordeuses. En 2013 : variété assez sensible au puceron vert, mais c'est la moins attaquée par le coryneum (contrairement aux années précédentes).

Origine : française (Rhône), 1^{ère} inscription 1961.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : bonne vigueur, boutons floraux doubles avec quelques boutons simples. Bonne productivité.

Port : semi-vertical.



Guilloux Élégante



Floraison : fin mars, rosacée.

Fruit : calibre moyen de 175g, forme arrondie, dissymétrique avec souvent une lèvre bien plus développée. Suture variable, superficielle à légèrement profonde. Sillon souvent craquelé vers le sommet. Epiderme moyennement pubescent, rouge foncé, moyennement taché, rayé. **Noyau :** libre, moyen, allongé, profondément sculpté, assez clair. **Chair :** blanche légèrement colorée de rouge. Grain assez fin, tendre, juteuse, saveur très agréable, bien sucrée.

	Prison	Date récolte
Guilloux Élégante	05-avril	10-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque et au monilia. Peu sensible au coryneum et à la rouille.

Comportement vis-à-vis du gel : Bonne résistance aux gelées d'hiver.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2010, fortement atteinte par le coryneum. En 2011 et 2012, moyennement atteinte par le monilia. En 2011, fortement atteinte par le puceron cigarier et moyennement atteinte par le puceron farineux du prunier. En 2011, faiblement atteinte et la cloque, moyennement par les pucerons verts. En 2012, moyennement attaquée par la cloque, fortement par les tordeuses et très fortement par les pucerons verts, de même qu'en 2013. Attaque moyenne de coryneum en 2013.

Plate Oriane®

Origine : française.

Classe du Catalogue : 3

Arbre : forte vigueur, rustique.

Port : intermédiaire, demi-étalé.



Floraison : moyenne, rosacée.

Compatibilité florale :

Fruit : petit calibre (100 à 130g), forme aplatie, régulière. Sommet du fruit assez bien fermé.

Epiderme duveteux, rouge à rouge orangé, lumineux, sur fond jaune-orangé. **Chair :** jaune ferme, fine et juteuse. Bonne qualité gustative, saveur douce.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Plate Oriane	05-avril	10-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2012, moyennement atteinte par la cloque. Faiblement attaquée par les pucerons verts et les tordeuses durant cette même année. En 2013, cette variété a été peu touchée par le coryneum.

Red Robin

Robin

Origine : U.S.A. (Californie), 1951 par M. Swim

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : vigueur moyenne à bonne, ramification moyenne, très longs rameaux. Productivité bonne et régulière.

Port : semi-dressé.



Floraison : 7 à 10 jours après Springtime, belles fleurs régulières, rosacées.

Compatibilité florale : autofertile.

Fruit : calibre moyen à petit 125g, forme ronde, régulière. Symétrique, aplatie vers le sommet avec parfois une fente ou un point de sève. Epiderme rouge vif très lumineux et attractif.

Noyau : petit, libre à maturité.

Chair : blanche, sanguine, ferme, très juteuse, sucrée douce, bonne qualité gustative. Acidulée, nécessite une cueillette proche de la maturité.

	de floraison	Date récolte
Red Robin	20-mars	05-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque, peu sensible à la bactériose.

Comportement vis-à-vis du gel : peu sensible sur fleurs.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2011, moyennement atteinte par la cloque et les pucerons verts. Faiblement attaquée par les pucerons en 2010, peu attaquée en 2011. En 2012, fortement attaquée par le monilia sur rameaux et moyennement sur fleurs en 2011. En 2012, fortement atteinte par la cloque, moyennement par les tordeuses et faiblement par les pucerons verts. Variété peu touchée par le coryneum et les pucerons verts en 2013.

Redwing

Origine : U.S.A. Californie, 1939.

Classe du Catalogue : 4.

Arbre : vigueur moyenne à bonne, ramification importante. Productivité moyenne à bonne.

Port : semi-dressé.



Floraison : précoce, 4 jours après Springtime (adaptée au Sud), campanulée.

Fruit : calibre moyen à gros (160 à 180g), forme arrondie, très régulière, légèrement aplatie au sommet. Epiderme rouge foncé. Bonne résistance aux manipulations et bonne tenue frigorifique.

Noyau : libre, petit, globuleux, assez clair.

Chair : blanche, ferme, très juteuse, saveur douce et sucrée, sans acidité. Bonne qualité gustative.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Redwing	20-mars	10-juillet
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : très sensible à la cloque et à la bactériose, moyennement sensible au *Fusicuccum amygdali*.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2010 et 2013, moyennement atteinte par le coryneum. En 2012, faiblement atteinte par le monilia et moyennement en 2011. En 2012, faiblement atteinte par la cloque, les pucerons verts et les tordeuses. Elle est légèrement plus touchée par les pucerons verts en 2013, mais le nombre de foyers reste relativement faible.

Sweet Cap

Maillarflat

Origine : française (Pyrénées orientales).

Classe du Catalogue : 4.

Arbre : forte à très forte vigueur, rustique.

Forte productivité.

Port : intermédiaire, érigé.



Données 2011

Floraison : tardive, rosacée.

Compatibilité florale :

Fruit : gros calibre (120 à 160g), forme très aplati, régulier.

Sommet assez bien fermé. Epiderme, fin, duveteux, rouge foncé à rouge rosé, strié, sur fond vert crème.

Chair : blanche, ferme et juteuse. Bien sucrée.



	Date floraison	Date récolte
Sweet Cap		Début août
Référence	jours après Redwing	jours après Redwing

Données référencées :

Maladies : sensible à la cloque.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2012, moyennement atteinte par la cloque et les tordeuses. Faiblement attaquée par les pucerons verts au cours de cette même année. Variété moyennement touchée par le coryneum en 2013.