




Oliviers

Variétés		Code GEVES	Numéro de page
Aglandau		3	2
Cayon		3	3
Grossane des Baux		3	4
Lucques		3	5
Négrette		4	6
Picholine du Gard		3	7
Rougette de l'Ardèche		Absente	8
Salonenque		3	9
Tanche		3	10
Verdale de l'Hérault		3	11
GRAB			

- Œil de paon



Aglandau

Verdale de Carpentras, Berruguette, Blanquette, Plan d'Aix, Cayanne de Marseille, Plan de la Fare.

Origine : française, 1^{ère} inscription 1986.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne, bonne résistance au vent. Rustique pour sols légèrement calcaires.

Port : semi-érigé, en boule.



Compatibilité florale : autofertile. Picholine, Cailletier.

Maturité : assez tardive, novembre à décembre dans le Sud-Est.

Fruit : ferme, contenant peu d'eau. Un peu arrondi, légèrement côtelé, bosselé, de taille moyenne, épiderme vert clair qui passe ensuite à un violet de plus en plus foncé. Olive riche en huile.

Consommation : utilisée pour son huile qui se conserve bien, en olive verte ou noire.

Remarque : variété qui alterne moins si elle est bien irriguée.

Données 2011-2013

	Date floraison	Date récolte
Aglandau	03-juin	Novembre à décembre
Référence	Variété de référence	Variété de référence

Données référencées :

Maladies : sensible à l'œil de paon, la teigne, la cochenille noire et à la fumagine. Résistante à la mouche de l'olive et à la verticilliose.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

Cayon

Cayoun, Plant d'Entrecasteaux, Entrecastelen,
Race de Montfort.

Origine : française, 1^{ère} inscription 1986.

Classe de Catalogue : 3.

Arbre : peu vigoureux à vigoureux.

Port : pyramidal, dressé.



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : autostérile, Amygdalolia,
Cornicabra, Manzanille.

Fruit : petit calibre, ovoïde, bonne saveur.

Consommation : utilisée pour l'huile.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

	Date floraison	Date récolte
Cayon	03-juin	
Référence	jours après Aglandau, jours après Grossane des Baux.	jours après Aglandau, jours après Grossane des Baux

Données référencées :

Maladies : sensible à la mouche de l'olivier.

Comportement vis-à-vis du gel : moyennement sensible au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 : forte sensibilité à l'œil de paon.

Grossane des Baux

Groussan

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : rustique, peu d'alternance de production.

Port : étalé.



Maturité : moyenne.

Compatibilité florale : auto fertile.

Fruit : rond, charnu, à peau lisse.

Consommation : utilisation en olive noire (saveur douce et sucrée), piquée au sel et pour l'huile.

Données 2011

Grossane des Baux

Référence

Date floraison

Variété de référence

Date récolte

Variété de référence

Données référencées :

Maladies : sensibilité à la teigne, à la cochenille et à la fumagine.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 : faible sensibilité à l'œil de paon.

Lucques

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne.

Port : étalé.



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : mâle stérile. Amellau, Corniale, Cayon, Cornicabra.

Fruit : allongé, en forme de croissant, peau lisse. Charnu, bosselé, noyau peu épais, beaucoup de chair.

Consommation : utilisée en olive verte, conserve, huile.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Lucques

Référence

jours après Aglandau

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : sensible à la mouche, à l'œil de paon et à la cochenille.

Comportement vis-à-vis du gel : peu sensible au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 : sensibilité à l'œil de paon assez importante.

Négrette

Noirette, Négret

Origine : française (Gard), 1^{ère} inscription 1986.

Classe du Catalogue : 4.

Arbre : rustique, pas d'alternance, doit être taillé tous les ans.

Port : érigé.



Maturité : novembre à décembre en Ardèche.

Fruit : petit calibre, bonne saveur.

Consommation : utilisée pour l'huile.



Données 2011	Date floraison	Date récolte
Négrette		Novembre à décembre
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 : faible sensibilité à l'œil de paon.

Picholine du Gard

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne, rustique, productive.

Port : bas.



Maturité : décembre à janvier (dans le Gard).

Fruit : calibre moyen, forme allongée, pointue à l'extrémité. Peau lisse.

Chair : ferme et fine.

Consommation : utilisée pour l'huile (rendement moyen), en olive verte de table ou pour cocktail.

Données 2011

Picholine du Gard

Référence

Date floraison

03-juin

Date récolte

jours après Aglandau

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : résistante aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 : faible sensibilité à l'œil de paon.

Rougette de l'Ardèche

Origine : française (Ardèche).

Arbre : pas d'alternance.

Port : étalé.



Maturité : décembre à mi-janvier (en Ardèche).

Compatibilité florale : auto fertile.

Fruit : calibre moyen, ovoïde, épiderme rougeâtre à maturité.

Consommation : utilisée pour l'huile.



Données 2011

Date floraison

Date récolte

Rougette de l'Ardèche

Référence

jours après Aglandau

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : résistante à l'œil de paon. Sensible à la mouche de l'olive.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 : moyennement sensible à l'œil de paon.

Salonenqu

e

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur faible.

Port : semi-pleureur.



Compatibilité florale : partiellement auto fertile.

Maturité : Novembre (dans la vallée de Baux de Provence).

Fruit : pyriforme, bosselé. Bourrelet sur le côté.

Chair : blanche.

Consommation : utilisée en olive verte ou pour l'huile.

Données 2011

Salonenque**Référence****Date floraison**

jours après Aglandau

Date récolte

Novembre

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : bonne résistance aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : Aucune information disponible.

2013 : idem : arbre qui reprend mais trop petit pour pouvoir évaluer les symptômes

Tanche

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : très vigoureux, résistant au froid.

Port : forme en boule.

Olive de Nyons, Tanche de M



Maturité : Décembre à janvier (dans la Drôme).

Compatibilité florale : auto-stérile. Cayon.

Fruit : forte tendance à la parthénocarpie. Petit calibre, rond.

Chair : Chair brun violacé.

Consommation : utilisée en olive noire ou pour l'huile.



Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Tanche	03-juin	Décembre à janvier
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : sensible à la mouche et à l'œil de paon.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : extrêmement sensible à l'œil de paon : variété qui présente le plus grand nombre de symptômes.

Verdale de l'Hérault

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : petit développement, vigueur moyenne.

Peu alternant.

Port : dressé

Olive de Ganges, Gangeole,
Redounale, Rousset



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : partiellement auto-stérile.

Fruit : calibre moyen, rond.

Chair : comporte de petites tâches claires.

Consommation : utilisée en olive verte et pour l'huile.



	Date floraison	Date récolte
Verdale de l'Hérault	03-juin	
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : sensible au verticillium, à la mouche de l'olive et à l'œil de paon.

Comportement vis-à-vis du gel : très résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : peu atteinte par l'œil de paon.

2013 : très sensible à l'œil de paon, en revanche