

Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière



FICHE DESCRIPTIVE PETITE LAITUE DE CASTAGNETO PO

Nom scientifique: *Lactuca sativa*.

Nom commun: *Laitue*.

Dénomination: *Petite laitue de Castagneto Po*.

Origine géographique: *Région Piémont – Province de Turin – commune de Castagneto Po et communes limitrophe telles que S. Raffaele Cimena, Casalborgone, Rivalba, S. Sebastiano Po.*

Reproduction: *allogame.*

Caractéristiques des SEMENCES

Couleur: *noire.*

Caractéristiques des FEUILLES

Les feuilles de bordures sont arrondies, légèrement ondulées, formant une rosette de 10 - 15 cm de diamètre.

Tonalité des couleurs vertes des feuilles externes: *absentes.*

Pigmentation anthocyanique: *absente*

Caractéristiques des FLEURS

Couleur: *jaune.*

PETITE LAITUE DE CASTAGNETO PO / CULTURE

APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES

La petite laitue de Castagneto Po est cultivée sur des terrains bien exposés et ensoleillés et riche en matière organique.

EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION

Le semis se fait en fin d'été, au début de l'automne à partir du 8 septembre, avec un allongement progressif de la durée de pré-levée de 5 jusqu'à 20 jours pour les semis les plus tardifs. Le semis se fait de manière échelonné.

EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

Apports (kg/quintal de produit):

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO
0,40	0,24	0,50	0,068

Il est conseillé d'effectuer un épandage avant semis avec incorporation de la matière organique dans le sol par travail du sol. Pour assurer un bon métabolisme de l'azote et limiter l'apparition de troubles physiologiques tels que les nécroses ou "Tip Burn", il est conseillé d'administrer de l'oxyde de calcium et de maintenir constamment le sol humide.

EPOQUE DE RECOLTE

La récolte a lieu lorsque les rosettes atteignent 15 cm de diamètre (à partir de décembre) et se poursuit jusqu'à la fin du mois de février.

MALADIES ET RAVAGEURS

Parmi les agents pathogènes, la pourriture basale causée par *Sclerotinia* spp., *Botrytis cinerea*, *Rhizoctonia solani* ainsi que le mildiou causé par *Bremia lactucae* sont les problèmes phytosanitaires majeurs. Les principaux ravageurs sont les pucerons, les limaces et les noctuelles.



La Petite Laitue de Castagneto Po était cultivée dans la région au début des années 1900. Traditionnellement elle se cultivait entre les rangées de vignes dans les vignobles après les vendanges. Elle présente une forte résistance au gel, une caractéristique unique pour le genre *Lactuca*. Elle annonce dans cette région les prémices de la saison d'hiver.

Projet Interreg Alcotra n. 139 "Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière"

www.bioeurope.info